

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 161  
du 21 Février 1990

\* DESHERBAGE CHIMIQUE DE LA Vigne : nouveautés, précisions \*

Le desherbage doit toujours être raisonné en fonction de la flore attendue, de la sélectivité de l'herbicide, des conditions d'application et du coût.

### 1) Situations sans graminées estivales ou à très large dominante dicotylédones

Deux solutions sont possibles :

=> Spécialités contenant du diuron associés à une triazine (VEGEPRON DS) PERAL vigne, CLERY, FENICAN et CLAIRSOL 85). L'apport fractionné est recommandé surtout si le sol est filtrant ou peu profond. Dans notre région le premier apport devra être réalisé au plus tard le 15 mars.

Tous ces herbicides n'ont aucune action sous les adventices levées. Il sera donc nécessaire de leur additionner un herbicide de **post levée** par ex : GRAMOXONE plus à 6 l/ha. AZURAL à 9-12 l/ha, BUGGY à 3-4-5 l/ha, WEEDAZOL TL, CIDAXTIL, RADOXONE TL, AMITRIL TL à 10-15 l/ha, GIROR à 10 l/ha, BASTA à 5 l/ha.

=> Le SEXTAN est une association de simazine et isoxaben. A 7,5 l/ha une seule application en prédebouffement permet de couvrir toute la campagne. Son efficacité est excellente sur de nombreuses plantes = senecon, morelle, erigeron, chenopode ou laituron mais sur graminées estivales (Panic, digitale, sétaire) son action est très limitée. Son application doit se faire fin février, début mars.

### Remarques

\*\* Réserver le PREFIX G 10 (70 kg/ha) et SURFASSOL G (90 kg/ha) aux situations difficiles : envahissement de prêles, aristoloches vu le coût /ha.

\*\* Pour tous les herbicides de pré-levée, des pluies après applications sont nécessaires pour assurer une bonne efficacité.

\*\* Le SOLICAM S à 5 kg/ha est essentiellement anti-graminée mais offre une efficacité satisfaisante sur quelques dicotylédones (chenopode, epilobe, erigeron, laituron)

P.5

## 2) Situations avec graminées estivales

Leur contrôle doit s'appuyer sur des applications de pré-levée. L'utilisation des herbicides de post-levée donne rarement de bons résultats. Différentes spécialités commerciales peuvent être utilisées.

=> Les spécialités à base de **diuron** en apport fractionné. Elles assurent également la destruction de la plupart des dicotylédones résistants.

=> VITIDOR (oryzalin + simazine) à 13 l/ha en une fois en fin d'hiver.

=> ZORIAL (norflurazon) à 2,5 kg/ha en une fois en fin d'hiver, le SOLICAM S (norflurazon + diuron) à 5 kg/ha sauf en sols filtrants.

=> DEVRINOL LF (8 l/ha) en mélange avec la simazine (2000 à 2500 g/ha).

### Remarques

\*\* Ces quatre derniers produits sont à utiliser au plus tard fin février dans notre région afin de bénéficier de pluies suffisantes pour bien les positionner.

\*\* Le rattrapage avec un anti graminé spécifique pourra être réalisé au stade 3-5 feuilles avec FERVINAL 2l/ha, ou FUSILADE X 2 0,8 l à 1 l/ha, ou TARGA D + 0,5 l/ha ou GALLANT 1,5 l/ha. L'adjonction d'huile est nécessaire.

### Sur les jeunes vergers

Deux nouveaux produits = le CENT 7 (isoxaben à 8l/ha qui présente une efficacité intéressante sur dicotylédones et le SURFLAN (oryzalin) à 8l/ha surtout performant sur graminées. Ils sont tous deux à utiliser en pré-levée.

```
=====
:      AMANDIER                                     :
:                                                         :
:      Les dessèchements de petits rameaux s'observent tous les :
:      ans au printemps dans notre région. Ils sont provoqués :
:      par des attaques de champignons tels que les Monilia :
:      ou le Fusisoccum. :
:      Il est recommandé d'effectuer un traitement à l'aide :
:      de fongicides tels que : benomy, carbendazime, :
:      thiabendazole juste au stade G, c'est à dire à la :
:      chute des pétales :
:=====
```

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.